

Taxon *Hordeum jubatum*

Název taxonu	<i>Hordeum jubatum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Hordeum jubatum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	ječmen hřivnatý
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hordeum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarctická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	primárně rozšířen v Severní Americe a v sv. Sibiři, druhotně v mnoha oblastech světa z tropické a subtropické oblasti

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá tráva v listu 15 - 20 cm vysoká v květu 40 - 60 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, mnohočetná, 40 - 60 cm dlouhá, ukončená obloukovitým květenstvím
Listy	světle zelené, oboustranně chlupaté, 10 - 20 cm dlouhé a 1 cm široké bez výrazné estetické hodnoty
Květenství	obloukovitě převislý lichoklas s velmi dlouhými (až 8 cm) osinami. Lichoklas vytráváním mění barvu od světle zelené přes zlatavou až nafialovělou. Po odkvětu se květenství ve vřetenu rozpadá a šíří do okolí
Květy	lichoklas
Plody	obilka
Vytrvalost	v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla	teplomilný taxon; vyžadující předpěstování
Faktor vody	svěží až suchá zahradní půda
Faktor půdy	zahradní půda bohatá na živiny
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné nároky; na přirozených stanovištích roste v prostředí od 6,5 - 9 ph, na hlinitých i písčnatých i na zasolených půdách

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití	letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení - před metáním. Při pozdní sklizni se květenství rozpadá ve větenu.
Růstové i jiné druhově spec..	elegance, pohyb ve větru, jemná textura
Doporučený spon pro výsad..	9 - 12 ks/m ²

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	předpěstování ve skleníku - výsev v dubnu, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu; na vhodném stanovišti se může přesévat.

Grafické přílohy

