

Taxon *Acalypha chamedrifolia* (*Acalypha hispaniolae*)

Název taxonu	<i>Acalypha chamedrifolia</i> (<i>Acalypha hispaniolae</i>)
Vědecký název taxonu	<i>Acalypha chamedrifolia</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Lam.) Müll.Arg.
Český název	akalyfa, 'kočičí ocásek'
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Acalypha hispaniolae</i> Urb.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Euphorbiaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Haiti, Dominikánská republika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt
Životní forma - poznámka	nízké keře, které mohou mít výhony v závěsných nádobách převislé nebo pokud jsou vysazeny v záhonu rostou výhony po povrchu vegetační vrstvy
Zařazení podle původu, nár...	druh řadíme v našich podmínkách z pěstitelského hlediska mezi letničky množené řízkováním

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímené keřky dorůstající v pěstování výšky okolo 20-25 cm (někdy i více - 30 cm)
Kořen	kořenová soustava hustě větvená, jednotlivé kořínky jsou jemné
Výhony	lodyhy vzpřímené či vystoupavé, ale i převisající nebo poléhavé, nazelenalé barvy, dorůstající do délky okolo 20-25 cm pokud rostliny pěstujeme jako letničky. Pokud rostliny přezimujeme ve skleníku mohou starší rostliny mít výhony delší až 30 cm (někdy i více).
Pupeny	drobné, nenápadné
Listy	střídavě, svěže zelené, vejčité, pilovitě zubaté a jemně pýřité.
Květenství	karmínově červená, uspořádána do válcovitých klasů, která vyrůstají z úžlabí listů. Jsou podobná kočičím ocáskům a dorůstají délky 8-10 cm.

Plody	nevýznamné
Možnost záměny taxonu (+..	záměna taxonu je nepravděpodobná

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	do příchodů mrazů

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	rostlina není mrazuvzdorná
Faktor vody	vyžaduje pravidelnou zálivku - hlavně v období vysokých teplot vzduchu v letních měsících
Faktor půdy	vyžaduje kyselejší substrát, v zásaditém substrátu může docházet k chlorózám
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	celé léto
Použití	okraje sesazovaných nádob- truhlíky, mísy, závěsné nádoby. Prodává se také jako hrnková kvetoucí rostlina pro krátkodobou dekoraci interiérů.

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
---------	---