

Taxon Vitis vinifera Ryzlink rýnský

Název taxonu	Vitis vinifera Ryzlink rýnský
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Ryzlink rýnský’ (RR)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Riesling weiss, Rheinriesling, Rhine Riesling
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patně německá odrůda, vznikla pravděpodobně spontáním křížením odrůd ‘Heunisch weiss’ a ‘Tramín červený’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, žlutavě hnědé, dobře vyzrávajcí
Pupeny	menší až středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté s mělkými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, většinou uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý, vzvlněný, vespod plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule kulatá malá až středně velká, žlutozelená; na vrcholu bobule je černá tečka po blizně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým tlustším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Sauvignon’ (na vrcholu bobule je černá tečka po blizně)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody	vlhké, jílovité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	méně náročná odrůda na půdy, lépe lehčí půdy, písčité až kamenité
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	většinou SO 4, CR 2 a 125 AA; na bujně rostoucích podnožích a při intenzivním hnojení dusíkem, dochází ke sprchávání

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, citlivější ke sprchávání
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Odrůdy	klony PO-27/5, VP-20/9, PO-90/12, VP-23/9, PO-89/12 a PO-100/G
Popis vína	víno má vůni kvetoucích lip, chuť je pepmě kořenitá či až medová, vyniká zvláště po ležení vína v sudě nebo v láhvi (vzniká petrolejový tón); mladá vína mají výraznější kyseliny
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína, sekty

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 114)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---



