

# Taxon Clematis 'Crimson King'

Název taxonu	Clematis 'Crimson King'
Vědecký název taxonu	Clematis
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Charles Noble</a>
Odrůda	'Crimson King'
Český název	plamének
Autor	Jana Mokričková ( <a href="mailto:jana_mokri_kov@unknown.cz">jana_mokri_kov@unknown.cz</a> )
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ranunculaceae</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Kultivar objeven A.G. Jackmanom v roce 1915 v Anglii, pochází z neznámého křížení

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Líana opadavá
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 2-4 m, popínavý
Výhony	tenké, hnědé, plstnatě chlupaté, hranaté, starší lysé, internodia dutá, starší dřevo na příčném řezu nápadně púrovité
Pupeny	vstřícné, malé, kuželovité, hustě bíle plstnaté, umístěné těsně pod ovíjivým vytrvávajícím řapíkem
Listy	řapíkaté, lichospeřené, po 3-5 lístků, s úponkovitými řapíky
Květenství	laty
Květy	výrazné, světle červené barvy, v průměru 12 - 15 cm velké
Plody	nažka s pérnatou čnělkou
Kůra a borka	hnědá

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	VIII. - IX.

## Nároky na stanoviště

Faktor světla světlomilný,

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilný, vyžadují však pristínění kořenů
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozován mrazem, Zóna 5 - 7
Faktor vody	vlhko, ne však příliš zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, vhodné jsou živné, ne těžké půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez kvete na bočních vyhonech loňského dřeva, a na konci léta na vrcholech nových výhonů, proto na začátku jara ponechat jen silné výhony seříznuté k páru silných pupenů

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického výrazu	leto - výrazné květy
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, trvalkové záhony, vyžaduje oporu
Choroby a škůdci	Vadnutí Plaménku ( <i>Phoma clematidis</i> ): Rychlé odumírání listů, celých výhonů i rostlin. Padlí ( <i>Erysiphe polygoni</i> ): Bělavý povlak na listech měkkých výhonech i květech. Plíseň šedá ( <i>Botrytis cinerea</i> ): Poupatá, květní stopky i stonky hnědnou, hnědý povlak plísň. Antraknoza Plaménku ( <i>Matssonia clematidis</i> ): Tmavě hnědé až černé skvrny často se šíří od čepele až podél středu listu. Mšice, Slimáci.

## Množení

---

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřízení a Roubování
Množení - poznámka	v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary rodu <i>Clematis</i> řízkování zelenými řízky, na řízku ponecháváme min. 1 pár listů, řízky s bočním poraněním, méně rozšířenou metodou je robování, jako podnože je možno využít <i>C. viticella</i> L. eventuelně <i>C. vitalba</i> L.

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každořočně zmlazovány řezem (cca 30 cm nad zemí)
Odkazy	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="http://www.clematisinternational.com">http://www.clematisinternational.com</a></li><li>• <a href="http://www.guernsey-clematis.co.uk">http://www.guernsey-clematis.co.uk</a></li><li>• <a href="http://www.parkon.cz">http://www.parkon.cz</a></li><li>• <a href="http://www.databaze.dendrologie.cz">http://www.databaze.dendrologie.cz</a></li><li>• <a href="http://www.clematis.hull.ac.uk">http://www.clematis.hull.ac.uk</a></li></ul>