

Taxon Viburnum xcarlcephalum

Název taxonu	Viburnum xcarlcephalum
Vědecký název taxonu	Viburnum xcarlcephalum
Jména autorů, kteří taxon p...	Burkwood ex A.V. Pike
Český název	kalina kulovitá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Viburnaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	vyšlechtěna v r. 1932 v Anglii (V. carlesii x V. macrocephalum)
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavé, víceméně kulovité nebo polokulovité, nepříliš hustě větvené keře, základní větve poněkud vystoupavě postavené, výška do 2,5 m
Výhony	letorosty hvězdovitě chlupaté
Pupeny	vstříčné
Listy	listy 6–12 cm dlouhé, široce vejčité, naspodu světlejší, na podzim červenavé
Květenství	květy ve velkých, až 15 cm širokých, kulovitých květenstvích
Květy	květy čistě bílé, v poupěti slabě narůžovělé, trubka asi 2.5 mm dlouhá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce, mírný stín
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	půda středně vlhká

Faktor půdy na živiny bohaté půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	IV - květ
Použití	soliterně či v malých skupinách

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Roubování
Množení - poznámka	nejčastěji množíme roubováním na V. lantana, řízky málo kdy zakoření a jsou z nich většinou jen slabé rostliny,