

# Taxon *Cucurbita pepo* convar. *giromontiina*

Název taxonu	<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>giromontiina</i>
Vědecký název taxonu	<i>Cucurbita pepo</i> convar. <i>giromontiina</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Greb.</a>
Český název	cuketa
Autor	Miloš Jurica ( <a href="mailto:milo_jurica@unknown.cz">milo_jurica@unknown.cz</a> )
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	convar. <i>Giromontiina</i>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Cucurbita</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Amerika
-------------------------------	---------

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	teplomilná zelenina

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	převážně keřčkový
Výhony	stonek hranný
Listy	dlanité, často s bílými skvrnami
Květy	žlutá až oranžová koruna
Plody	stopka plodů hranná, tvrdá, různá barva pokožky: zelená, žíhaná, žlutá, bílá
Semena	bíla s okrajem, HTS 130 - 160 g
Vytrvalost	jednoletá

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Září

## Doba zrání

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Říjen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor půdy      humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí,  
písčitohlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5

## Užitné vlastnosti

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ), antraknóza tykvovitých ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> ), šedá hniloba, květilka všežravá ( <i>Hylemyia platura</i> )

## Množení

---

Množení      Přímý výsev

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejblíže státní silnice... / ZF - P -](#)  
[Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)