Taxon Petrosedum anopetalum

Název taxonu	Petrosedum anopetalum
Vědecký název taxonu	Petrosedum anopetalum
Jména autorů, kteří taxon p...	(DC.) Grulich
Odrůda	´Centaurus´
Český název	rozchodník bledožlutý
Synonyma (zahradnicky pou..	Sedum ochroleucum Webb.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Balkánská pohoří, především v termofytiku a mezofytiku

Zařazení

Fytocenologický původ	petrofyt, phellofyt - na vápencích vystupuje k 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nár...	skalky, suché zídky, extenzívní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus	poléhavě polštářovitá trvalka
Kořen	adventivní, nitkovitý
Výhony	sterilní poléhavé, vystoupavé, velmi hustě olistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1-0.2 m
Listy	cylindrické - silně dužnaté, osinkatě špičaté, tmavozelené nebo šedivě ojíněné, často purpurově naběhlé
Květenství	vzpřímené, vidlanovitě větvené, žláznaté vijany bez listenů
Květy	heterochlamydeické, šestičetné, zvonkovitě sevřené, bledě žluté, diplostemonické, pestíky v receptakulu ze srostlých sepalů
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	měchýřky bez okrasné hodnoty
Semena	velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná
Možnost záměny taxonu (+..	na deset v nekvetoucím stavu snadno zaměnitelných druhů rodu - za květu snad jen s Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, nápadně robustním taxonem s květy hvězdicovitě rozevřenými v nežláznatých vijanech

Dlouhověkost	relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	heliofyt
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -25°C (USDA)
Faktor vody	xerofyt
Faktor půdy	propustná, pH 5.5-7.0
Faktor půdy - poznámka	přizpůsobivý taxon, upřednostňuje však půdy zásadité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	hodnocení Hensen & Groendijk-Wilders (1984) i Sieber (1989, pro odrůdu ´Centaurus´): upotřebitelné pro zahrádkáře
Doporučený spon pro výsad..	16-24 rostlin na m2

Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřik segmentů (extenzívní střešní zeleň)
Konečné hrnky	8 cm
Retardace	ne
Květní tvorba	exaktní data nedostupná
Odrůdy	množství populací lišících se zabarvením a ojíněním listů - prozatím jen ´Centaurus´ s listy purpurově stínovanými pod odrůdovým jménem

Ostatní

Poznámka	Legenda ke grafické příloze 1 - Uher-Petrosedum.varia: 1. Petrosedum anopetalum; 2. Petrosedum sediforme; 3.

Petrosedum rupestre ‘Angelina’; 4. Petrosedum rupestre; 5. Petrosedum montanum ‘Jenny’; 6. Petrosedum forsterianum ‘Elegans’

Odkazy

- Gallo L. (2009): Sedum ser. Rupestria Berger (Crassulaceae): work in progress toward a checklist of taxa and their distribution. Bocconea 23: 203-205; Grulich V. (1984): Generic dividion of Sedoideae in Europe and adjacent regions. Preslia 56 (1): 29-45;

Grafické přílohy

1
2
3
4
5
6