

Taxon *Vitis vinifera* Diamant

Název taxonu	Vitis vinifera Diamant
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Diamant´ (Di)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	JBPK 13/22
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Julski biser´ x ´Panonia Kincse´

Zařazení

Pěstitelská skupina - pozná..	stolní bílá odrůda
Životní forma	Faneroxyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, světlé barvy, dobře vyžívající
Pupeny	středně velké, širší, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, s průsvitem; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je velký až velmi velký, kuželovitý, poněkud hustý; bobule je středně velká až velká, oválná, zelenožlutá
Semena	velká, hruškovitá, s dlouhým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), náchylnost na mrazy
Faktor vody	příliš suché půdy nejsou vhodné
Faktor půdy	hluboké, hlinitopísčité vlhčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň či dlouhý čípek
Podnož	do chudších půd Kober 125 AA, do vlhčích a humóznějších pak Teleki 5C či CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	bílá stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	má nižší odolnost k houbovým chorobám, sprchává
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos až 6-10 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitější, neutrální až sladší chuť

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 127)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

