

Taxon Abies amabilis

Název taxonu	Abies amabilis
Vědecký název taxonu	Abies amabilis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Dougl.) Forbes
Český název	jedle líbezná
Synonyma (zahradnický pou..	nepoužívají se
Autor	Pavel Bulíř (pavel_bul_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Abies

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	oblast Skalistých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - po..	horské oblasti západní části USA, především státy Washington, Oregon, Britská Kolumbie, až do nadmořských výšek kolem 2 000m.n.m.

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jehličnatý strom stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	20-30m vysoký strom s etážovitě větvenou, pravidelnou kuželovitou korunou, ve stáří zaoblenou
Výhony	šedé či šedohnědé hustě pýřité
Pupeny	zakulacené červenohnědé barvy, silně pryskyřičnaté
Listy	jehlice větvičku téměř zcela zakrývají, postavené šikmo do stran a poté místo střední klínovité brázdy přímo dopředu, 20-30 x 2mm velké, zakončené mělkým výkrojkem, osluněné jehlice na bujných výhonech částečně zprohýbané, krátce špičaté, jehlice na líci sametově leskle tmavozelené, na rubu s dvěma širokými (až 3x širšími než středové zelené žebro) bělavými řadami průduchů
Plody	až 15cm velké šišťice se skrytými podpůrnými šupinami
Kůra a borka	v mládí světle šedá hladká, ve stáří šedohnědá rozbrázděná
Možnost záměny taxonu (+..	Abies nordmanniana - jehlice větvičku zcela zakrývají, mohou vytvářet úzkou klínovitou brázdu, s nápadným výkrojkem na konci a dvěma užšími řadami bílých průduchů na rubu, výhony žlutohnědé až červenohnědé, krátce chlupaté, pupeny suché!
Dlouhověkost	středněvěká

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	zejména v mládí jako většina jedlí stínomilná, v dospělosti snáší i plné oslunění
Faktor tepla	poměrně mrazuvzdorná jedle, vhodná zejména do oblastí III-IV., v předjaří může namrzat (pozdní jarní mrazíky), vyhovuje jí především atlantické klima, podobně jako většině jedlí
Faktor vody	vyžaduje stanoviště s vyšší vzdušnou vlhkostí a dostatkem vláhy, čerstvě vlhká a propustná
Faktor půdy	poměrně nenáročný druh, pokud jsou půdy dobře zásobeny vodou

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	X-III
Použití	velmi atraktivní a málo používaný druh, který by si zasloužil větší pozornost, skupinky, solitéry, vánoční stromky
Choroby a škůdci	významější nejsou

Množení

Množení	Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za kůru
Množení - poznámka	základní druh je možné množit vedle roubování, také generativně, kultivary roubováním
Odrůdy	‘Spreading Star’ - poléhavě při zemi rostoucí forma, zpravidla do 2m

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [BZA - Panoptikum / Botanická zahrada a arboretum Brno](#)