

# Taxon *Berberis vulgaris*

Název taxonu	Berberis vulgaris
Vědecký název taxonu	Berberis vulgaris
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	dříšťál obecný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Berberis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	stř. a již. Evropa, Kavkaz, Irán

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	1,5-3 m, kulovitý opadavý keř
Výhony	rýhované šedožluté letorosty
Pupeny	střídavé
Listy	listy dlouhých výhonů přeměněny v trny 1-2 cm dlouhé, jednoduché až 3-7 dílné, listy eliptické až (ob)vejčité nebo obkopynaté, 2-6(-8) cm, svazečkovitě nahloučené, jemně zubaté, na každé straně s 8-30 osténkatými zuby, řapíky 1 cm
Květenství	květy v nících hroznech (2-)3-5(-7) cm
Květy	velmi časně, bohaté, žluté
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	plody tmavě červené, 8-15 mm
Kůra a borka	hladká, bělavě zelená kůra
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-IV
Faktor vody	suchovzdorný
Faktor půdy	nenáročný
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez nevyžaduje, ale snáší ho velmi dobře - vhodný do stříhaných živých plotů

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... IV-V - kvetení, po zbytek vegetační sezóny též  
 Použití nejlépe jako solitéra nebo do skupin keřů v sídlech i krajině, živé ploty  
 Choroby a škůdci netrpí

## Množení

---

Množení Řízkování, Bylinné řízky, Hřížení a Roubování  
 Množení - poznámka Roubování: Roubovanci rychle narostou, avšak podnož vždy podrůstá. Pro vzácné druhy je to však možnost, jak snadno a rychle získat množitelský nebo semenný materiál. Lepší roubovat na jinak zbarvenou podnož - snáze se pak rozliší podrůstající výhony.  
 Odrůdy Atropurpurea', listy tmavě červené, spodní strana trochu ojíněná