

# Taxon *Phlebodium aureum*

Název taxonu	Phlebodium aureum
Vědecký název taxonu	Phlebodium aureum
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(L.) J. Sm. (1841)</a>
Český název	flebódium; tečkovka zlatá
Synonyma (zahradnický pou..)	Polypodium aureum L.; Chrysopteris aurea (L.) Link; Pleopeltis aurea (L.) C. Presl
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Phlebodium</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše, Karibská oblast, Orinocká oblast, Andská oblast, Amazonská oblast a oblast Guyanské vysočiny
Biogeografické regiony - po..	tropické oblasti Střední i Jižní Ameriky, naturalizován: Srí Lanka

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Epifyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	robustní kapradina, výrazný soliterní epifyt, výšky až 1 m; poměrně rychle roste; staré listy hluboce převisají
Kořen	tlusté, dlouze plazivé až poléhavé nadzemní rhizomy (oddenky), pevně přichycené k borci stromů a pokryté zlatohnědými plevinami
Listy	čepel peřenosečná, 100 x 30-50 cm, dělená do nepravidelných úkrojků; koncový úkrojek 25 x 4 cm, boční cca 30-40 x 4 cm; řapíky žluto-hnědé, pevné, okrouhlé, hladké, dlouhé 50-100 cm; výtrusnicové kupky (sori) zlatavě oranžové, malé, okrouhlé, v 1 nebo 2 nepravidelných řadách mezi hlavní žilkou a okrajem listové čepele, ke každé kupce vedou většinou dvě žilky
Možnost záměny taxonu (+..)	Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger - velmi podobný, sbírkový druh; výtrusnicové kupky jsou v absolutně přesné řadě mezi středním žebrem lístku a okrajem

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	snáší rozptýlené světlo až lehčí polostín
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; v zimě 18-22 °C, teplota by neměla poklesnout pod 12 °C
Faktor vody	bal udržovat rovnoměrně vlhký, pak dobře snáší i suchý vzduch; ideální je však občasné porosení; zálivka i rosení měkkou vodou; nesnáší přemokření substrátu
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	nádherná solitéra do teplých zimních zahrad a dočasně i interiérů; epifytní kmeny; je možné ji pěstovat rovněž terestricky, je však nutné ji vysadit na povrch velmi vzdušného substrátu pro pěstování epifytů

## Množení

---

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělků
Množení - poznámka	výsev výtrusů při teplotě substrátu 20 °C; rodozměna: výsev výtrusů - prothaliu - oplození - mladé rostliny
Odrůdy	'Glaucum' - namodrale ojíňený, šupiny hnědé; 'Mandaianum' - vlnitý okraj úkrojků; 'Davana' - kompaktní, cca 30 cm, list mělce laločnatý, úkrojky silně zvlňené; 'Blue Star' - namodralý

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/26602380?tab=references>
- <http://www.tropicos.org/Name/26602380?tab=chromosomecounts>

## Grafické přílohy

---





