

Taxon Vitis vinifera Augustovskij

Název taxonu	Vitis vinifera Augustovskij
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Augustovskij’ (Aug)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	III-45-64
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o moldavskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Villard Noir (SV 18 315)’ x ‘Čabaňská perla’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, většinou trojlaločnaté, mělce vykrajované, řapíkový výkrojek je tvaru písmene V, úzce otevřený; povrch listu je hladký až jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je menší až středně velká, elipsovitá, žlutozelená
Semena	menší, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen
Konec doby zrání Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnož na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum i burčák
Choroby a škůdci odolná k houbovým chorobám
Plodnost velmi raná, pravidelná (výnos 5-7 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je chruplavá, chuť nasládlá, s jemným muškátovým aroma

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 125\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

