

Taxon Campanula glomerata

Název taxonu	Campanula glomerata
Vědecký název taxonu	Campanula glomerata
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Emerald’
Český název	zvonek klubkatý
Synonyma (zahradnický pou..	Campanula aggregata, Campanula petraea, Weitenwebera glomerata, Weitenwebera glomerata, Campanula cephalotes
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	rozeznává se několik poddruhů
Nadřazená kategorie	Campanula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	eurosibiřský druh, od pobřeží atlantického (z Iberského po Skandinávský poloostrov) po pacifické (Poamuří, Heilonjiang) a do Japonska: V ČR domácí, roztroušeně rostoucí hlavně v teplejších oblastech, zasahuje ale i do podhůří - cca do 800 m n.

Zařazení

Fytocenologický původ	lesostepi, vysychavé kamenité a křovinaté stráně, světlé okraje porostů stromů a křovin na výhřevných hlinitých půdách
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá bylina, vzpřímeně rostoucí, plazivým oddenkem se mírně do okolí rozšiřující 30-60 cm vysoká
Kořen	tlustý, šikmý a později dřevnatý oddenek
Výhony	lodyha přímá, chlupatá nebo i lysá, většinou nevětvená, jemně rýhovaná, načervenalá, sporo větvená v horní části
Listy	přízemní a spodní lodyžní listy s dlouhými řapíky, na bázi zaokrouhlené nebo srdčité, střední a horní listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé, někdy i poloobjímavé; L vespod pýřité nebo chlupaté, na okraji listové čepele jemně nepravidelně zubaté či vroubkované
Květenství	dominantní vrcholový strboul a několik menších strboulů v podobě

Květy	1 - 4 květých klubíček (glomer) v úžlabí listenů v horní části lodyhy oboupohlavné, pětičetné, kališní lístky špičaté, mírně ven ohnuté, koruna nálevkovitá, cca 2-3 cm dlouhá, modrofialová, žíldka bílá
Plody	tobolka (vejčitá nebo kuželovitá), 4 mm dlouhá
Semena	okrouhlé, elipsovitě nebo nepravidelné, na konci zaoblené
Vytrvalost	vytrvalý
Dlouhověkost	středně dlouhověký
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	toleruje mírné přistínění
Faktor tepla	upřednostňuje teplé polohy
Faktor vody	přiměřeně vlhké, tolerantní k suchu
Faktor půdy - poznámka	neutrální půdy, snese i půdy s vyšším obsahem vápníku, těžší hlinité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	tradiční záhonové výsadby, vhodná také do přírodě podobných vegetačních prvků - stepní porosty, okraje porostů dřevin
Použití	Řez květenstev - obchodovatelná na květinových burzách
Doporučený spon pro výsad..	12 ks/m2

Množení

Množení	Generativní, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělky
Odrůdy	kompaktní ('Bellefleur Blue', 'Bellefleur White', volně rostoucí nižší ('Acaulis', 'Speciosa'), bíle kvetoucí ('Schneekrone', 'Alba'), jemně fialový ('Caroline'). Osvědčené historické odrůdy: 'Alba', 'Dahurica', 'Acaulis'

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 'Joan Elliott', 'Emerald' - V/ 2024
Dodavatel 'Joan Elliott', 'Emerald' - Jiří Batůšek
Odkazy

- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/362>

Grafické přílohy

