

Taxon Fraxinus angustifolia ssp.danubialis

Název taxonu	Fraxinus angustifolia ssp.danubialis
Vědecký název taxonu	Fraxinus angustifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	Vahl
Český název	jasan úzkolistý
Synonyma (zahradnický pou..	Fraxinus oxycarpa, Fraxinus excelsior var. Angustifolia
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	ssp. danubialis
Nadřazená kategorie	Fraxinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	lužní lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	mohutné rychle rostoucí stromy, 20-35 m, koruna elipčitá, větvení pravidelné, textura jemnější než F. excelsior
Výhony	letorosty lysé, šedavé
Pupeny	pupeny hnědé až hnědočerné, někdy po 3 v přeslenu
Listy	lichozpeřené z 9-13 lístků, úzké 1-2 cm, lysé, kopinaté, ve střední části asi se 3 zuby na 1cm, ostře pilovité, se špičkami vzhůru zahnutými, tmavě zelených, přisedlých nebo téměř přisedlých, báze klínovitážilnatina na rubu slabě patrná
Květenství	krozny z postranních pupenů
Květy	bezkorunné
Plody	na bázi klínovité křídlaté nažky, semenné pouzdro delší než 1/2 nažky
Kůra a borka	kůra šedá, ve stáří rozpukaná v černohnědou, hluboce síťově rozbrázděnou borku
Možnost záměny taxonu (+..	Fraxinus excelsior (postranní pupeny po 2, černé; listy širší, na podzim nebarví, opadávají dříve)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	kvete v dubnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	semena se sklízí v září a říjnu
-----------------------	---------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilný, snese mírné přistínění
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	není tak náročný na světломilnost jako F. excelsior
Faktor tepla	vyhledává teplé lužní polohy, oblast I, citlivý na silné mrazy
Faktor vody	vyžaduje vysokou hladinu spodní vody, dobře snáší záplavy
Faktor půdy	upřednostňuje humózní, hluboké, živné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	na podzim barví červenohnědě až mahagonově
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	nemnoží se, v krajinných úpravách v lužních polohách - doplňková a výplňová dřevina
Růstové i jiné druhově spec..	výrazné podzimní zbarvení

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Očkování, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka	kultivary roubojeme, jako podnož volíme F. excelsior
Odrůdy	‘Elegantissima’ - listy obvykle po 11 lístcích, drobně pilovitých; vše lysé; ‘Pendula’ - listy drobné, výhony tenké, větve převislé; ‘Raywood’ - velmi vitální, barví červeně purpurově

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Hubertka / Zámecký park v Lednici](#)