

Taxon Stromanthe thalia

Název taxonu	Stromanthe thalia
Vědecký název taxonu	Stromanthe thalia
Jména autorů, kteří taxon p...	(Vellozo) Braga (1995: 1829 jako...
Odrůda	‘Triostar’
Synonyma (zahradnický pou..	Stromanthe sanguinea Sond., Stromanthe spectabilis Lem.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Stromanthe

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Brazílie (Bahia, odtud po atlantickém pobřeží k jihu do Paraná)

Zařazení

Fytcenologický původ	efylofyt - lesy formace mata atlantica, v horách až k 1400 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá bylina až 1.5 m vysoká, s velikými, dvouřadými, kopinatými, vzpřímenými, diskolorními listy
Kořen	adventivní kořeny
Výhony	bezlodyžné rostliny s podzemními oddenky
Listy	antitropní, pochvatě řapíkaté (poměr délky řapíku k čepeli proměnlivý v ontogenezi), asymetricky kopinaté, až 0.6 m dlouhé, lysé, shora sytě zelené s bledým žebrem, vespod purpurové (ale zelené u "Stromanthe spectabilis")
Květenství	latnatá soukvětí s krvavě červenými listeny a květy (nápadnými však hlavně bílými staminodiemi) na masitých růžových stopkách
Květy	oboupohlavné, asymetricky trojčetné, krvavě červené se sněhově bílými staminodiemi (plodná jen polovina jediné tyčinky)
Plody	červená tobolka
Semena	drobná, elipčitá, s bělavým arillem
Možnost záměny taxonu (+..	svérázný, stěží zaměnitelný taxon - blízká Stromanthe lutea Eichler má konkolorní listy a oranžová soukvětí s bledě žlutými květy
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	10-20 klux, od 25 klux nutno stínit; k udržení kvality v bytech nejméně 0.8-1.2 klux
Faktor tepla	množení 22°C-24°C na spodním teple, produkce v létě 20°C-24°C, ani v noci ne pod 18°C, v zimě dle osvětlení 18°C-22°C
Faktor vody	voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy	propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 4.5-6.0, EC do 1.2 mS/cm
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	bakterie (Pseudomonas), početné askomycety (Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Colletotrichum; Pyricularia, Acremonium, Dictyochaeta, Rhinocladiella, Phialocephala, Tetraploa, Sporidesmiella); ze škůdců štítenky (Diaspis, Pulvinaria), roztoči (Steneotarsonemus), molice (Trialeurodes), třásněnky (Frankliniella), háďátka (Meloidogyne)
Doporučený spon pro výsad..	produkce v hrnkách: 14-18 hmků na m2 nebo méně, dle velikosti zboží

Množení

Množení	Řízkování, Bazální řízky, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	jako řízky se upravují laterální pupeny odlámané z oddenku
Mezihrnky	10 cm v případě přehrnkování do 16-20 cm hmků k dopěstování velkých rostlin
Konečné hrnky	zakořenělé oddělky do 12-14 cm hmků
Květní tvorba	pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace	hrnkové kultury: menší rostliny z oddělků cca 6-8 měsíců (v hrnkách 10-14 cm), velké rostliny (16-20 cm hrnky) až 18 měsíců
Odrůdy	krémově pestrolisté 'Magic Star' ('Valmic') a 'Triostar', přes krémovou variegaci duhově probarvené 'Multicolor' a 'Horticolor'

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky	VBN 2010: 449 tis.prodaných hrnků (1.05 mil.eur) - 117. pozice mezi hrnkovými rostlinami; 2005: ještě 636 tis.prod.hrnků (1.79 mil.eur), z toho 288 tis.rostlin 'Triostar' a 251 tis.hrnků 'Multicolor'
Poznámka	AGM 1993
Odkazy	• Braga J.M.A. (1995): Uma nova combinacao no genero Stromanthe Sonder (Marantaceae). Eugeniana 21: 22-24. -- Prince L.M., Kress W.J. (2006): Phylogenetic relationships and classification in Marantaceae: insights from plastid DNA sequence data. Taxon 55 (2) • https://www.monaconatureencyclopedia.com/stromanthe-thalia-2/?lang=en

Grafické přílohy



