

# Taxon *Potentilla fruticosa* 'Abbotstwood'

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | <i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotstwood'    |
| Vědecký název taxonu           | <i>Potentilla fruticosa</i>                  |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | 'Abbotstwood'                                |
| Český název                    | mochna křovitá                               |
| Synonyma (zahradnicky pou..    | <i>Dasiphora fruticosa</i>                   |
| Autor                          | Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Potentilla</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holarktická květenná říše                                                            |
| Biogeografické regiony - po.. | Původ kultivaru: byl vyšlechtěn Fredem Tustinem, Abbotstwood, Anglie před rokem 1960 |

## Zařazení

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Pěstitelská skupina | Listnatý keř opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt            |

## Popisné a identifikační znaky

|              |                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus      | Drobný, opadavý, pomalu rostoucí, rozložitý keř, dosahuje v 10 letech výšky 0,6 až 0,8 m a šířky 0,9 až 1,2 m               |
| Výhony       | letorosty obvykle zprvu chlupaté                                                                                            |
| Pupeny       | střídavé                                                                                                                    |
| Listy        | opadavé, listy 3–7četné, tuhéjasně až stříbřitě zelené, lichozpeřené, složené většinou z 5 lístků, délka listu 1,5 - 2,2 cm |
| Květenství   | jednotlivě nebo v koncových latách nebo vrcholících, vrcholové po 1 až několika                                             |
| Květy        | bílé se žlutými tyčinkami                                                                                                   |
| Plody        | chlupaté nažky                                                                                                              |
| Kůra a borka | hnědočervená až hnědá                                                                                                       |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
| Konec doby kvetení   | Srpen  |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                          |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                          |
| Faktor světla - poznámka | Pro bohaté kvetení vyžaduje plné slunce nebo jen slabý stín                |
| Faktor tepla             | Zóna 3 (- 40 °C)                                                           |
| Faktor vody              | vyžaduje běžnou půdu, raději propustnější a přiměřeně vlhko                |
| Faktor půdy              | nenáročná, roste v běžné zahradní půdě, pH slabě kyselé až slabě alkalické |
| Faktor půdy - poznámka   | na suchých nebo silně alkalických půdách trpí chlorózou                    |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řez | pro pravidelné a bohaté kvetení je vhodné rostliny průběžně zmlazovat, snáší dobře i hluboké zmlazení |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Užitné vlastnosti

---

|                               |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetickéh... | období v květu                                                                                                                                                              |
| Použití                       | okrasný keř - solitera, skupiny, zejména však plošné zahuštěné výsadby jako půdní pokryv, vhodný pro nízké volně rostoucí živé plůtky a obruby, pro osázení mobilních nádob |

## Množení

---

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky                                                                                         |
| Množení - poznámka | nejpoužívanější způsob je množení bylinnými řízky odebíranými v období června, doporučuje se použít rovněž stimulator o 1000 ppm IBA |

## Celky sbírek

---

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem (Matečnice)</a></li> </ul> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

---

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výsev/výsadba na stanoviš... | 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odkazy                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.databaze.dendrologie.cz">www.databaze.dendrologie.cz</a>,</li> <li><a href="http://www.openbaargroen.be">http://www.openbaargroen.be</a></li> <li><a href="#">, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,</a></li> </ul> |