

Taxon Prunus armeniaca ‘Sylvercot’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Sylvercot’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Sylvercot’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Benoit Escande, Francie
-------------------------------	-------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Peckovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vznosná, kompaktní koruna, v plodnosti se rozkládá, předčasný obrost je vytvářen v menším množství
Listy	středně velké
Květy	bílé, libovonné
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	velmi velké, v dobrých podmínkách až 70g, kulovité, hladké, matné žluto oranžové barvy, intenzivně červené zbarvení pokrývá cca 40% plochy plodu, dužnina velmi pevná, světle oranžová, dobře odlučitelná od pecky, chuť je dobrá, harmonická, plody velmi dobře snáší přepravu

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, kratší perioda kvetení
-------------------------	------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	střední, 12 dní před ‘Velkopavlovická’, 2. meruňkový týden
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	dosti velká mrazuodolnost květních pupenů
Faktor půdy	vyhovují hlinito-písčité půdy, pH 5,5-8,0

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož dle pěstitelských podmínek, semenáč, i broskvoňový semenáč, St. Julien A, Wagenheim, myrobalán

Užitné vlastnosti

Použití	vhodná pro přímý konzum i zpracování, cukernatost cca 11%, skladovatelnost plodů až 2 týdny
Choroby a škůdci	odolná vůči chorobám
Růstové i jiné druhově spec..	středně silně vzrůstná odrůda
Plodnost	časná, vysoká, pravidelná, nepotřebuje probírku

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

