

Taxon Vitis vinifera Muskat moravsky

Název taxonu	Vitis vinifera Muskat moravsky
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Muskát moravský’ (MM)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	MOPR , PO-23/33
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Muskát Ottonel’ x ‘Prachtraube’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, někdy hůře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, pětiúhelníkové, pětilaločnaté s mělkými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký, spodní strana středně hustě štětinatá
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, křídlatý, středně hustý hrozen; bobule kulatá, středně velká, žlutozelená
Semena	malá až středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Muskát žlutý’ (MOPR je ranější a nemá vespod plstnaté listy)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 5 BB nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	citlivá zejména k houbovým chorobám, napadána hmyzem
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno vůně muškátové, někdy až do pomeranče; chuť lehčí, s nižším obsahem kyselin
Doporučená technologie vína	burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 113)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

