

# Taxon *Panicum capillare*

Název taxonu	<i>Panicum capillare</i>
Vědecký název taxonu	<i>Panicum capillare</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	proso vláskovité
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Poaceae</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarctická květenná říše, Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	mírné pásmo SA - stepi, ojediněle i v jižní Americe; zavlečený do Asie a Evropy - především s dovozem zemědělských komodit; občas u nás v teplých oblastech splaňuje kolem železničních tratí

## Zařazení

Fytcenologický původ	primárně osídluje otevřené plochy - prerie, okraje cest, polí, sadů; sekundárně šířen železniční a námorní dopravou
Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzdušná, jemná, trsnatá tráva, v pěstování nejčastěji 50 - 60 cm vysoká v době květu
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, pevná, okrouhlá, hrubá, nevětvená nebo už od báze rozvětvená, hustě jemně pýřitá
Listy	ploché, 10 - 40 cm x 1 - 1,5 cm, na konci zašpičatělé, s odstávajícími, často až 1 cm dlouhými velmi jemnými chloupky a s výrazně chlupatou pochvou
Květenství	velmi jemná, vzdušná 5 - 20 cm dlouhá lata drobných klásků nesených niťovitými větévkami; nejatraktivnější v době otvírání z pochvy listu, kdy trychtýřovitě vytryskne a jemně přepadá do stran
Květy	lichoklas s osinami
Plody	obilka elipčitá, 1,5 mm velká, zprvu zelená, posléze světle hnědá

Vytrvalost v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení Červenec  
Konec doby kvetení Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti  
Faktor tepla teplomilný taxon vyžadující předpěstování  
Faktor vody zahradní půda s občasnou zálivkou; k sušší půdě tolerantní  
Faktor půdy živné, propustné, písčitohlinité půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - slabě kvete nebo nemusí vůbec zakvést

## Užité vlastnosti

---

Období hlavního estetického... velmi dekorativní od července do konce vegetačního období  
Použití - pro trvalky VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon  
Použití Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - nutno sklízet na počátku metání. Lichklasy se i tak mohou rozpadat.  
Růstové i jiné druhově spec.. cenná pro svoji velmi jemnou texturu a svěže zelenou barvu  
Doporučený spon pro výsad.. 7ks/m<sup>2</sup>

## Množení

---

Množení Předpěstování sadby  
Množení - poznámka předpěstování ze semen v dubnu. Výsadba na záhon v druhé polovině května. Někdy se přesévá.  
Odrůdy 'Fontaine' - bohatě kvetoucí kultivar s načechralým kvetenstvím

## Grafické přílohy

---

