

Taxon Sorbaria tomentosa var. angustifolia

Název taxonu	Sorbaria tomentosa var. angustifolia
Vědecký název taxonu	Sorbaria tomentosa var. angustifolia
Jména autorů, kteří taxon p...	(Lindl.) Rehder (Wenz.) Rahn
Český název	jestřábník Aitchisonův
Synonyma (zahradnicky pou..	S. aitchisonii (Hemsl.) Rehder, S. angustifolia (Wenz.) Zabel
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Íránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	západní Čína, Kašmír, Afghánistán a Pákistán

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý rozkladitý keř 2-3 m vysoký
Výhony	letorosty lysé
Pupeny	střídavé
Listy	listy s 15-21 lístky, které jsou (úzce) kopinaté, 40-100 mm dlouhé, 6-15 mm široké, zašpičatělé, ostře pilovité, při rašení načervenalé
Květenství	květy ve vzpřímených lysých latách, 20-45 cm širokých
Květy	květy asi 1 cm široké, tyčinky delší než korunní lístky
Plody	plody červené měchýřky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	teplomilná, namrzá
Faktor vody	snese sucho
Faktor půdy	nenáročná

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	VII-VIII - květ, podzim - žlutooranžový barvič
Použití	keřové skupiny, solitery, svahy, meliorační dřevina

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Kořenové řízky a Množení oddělky
Množení - poznámka	výsev osiva do pařeniště je možný, ale účelný jen pro introdukci, množíme zelenými řízky, ale nejlépe oddělky nebo kořenovými řízky