

Taxon Santolina chamaecyparissus

Název taxonu	Santolina chamaecyparissus
Vědecký název taxonu	Santolina chamaecyparissus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	santolína cypřišovitá
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Echinacea simulata

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Makaronézská oblast
Biogeografické regiony - po..	Středomoří - Francie, Španělsko

Zařazení

Fytocenologický původ	středomořské makkie,
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nízký bohatě rozvětvený keřík cca 15 - 50 cm vysoký a 60 - 80 cm široký, aromaticky, vonný, velmi jemné textury
Kořen	silný vřetenovitý
Výhony	vzpřímené až vystoupavé, sterilní hustě olistění, květonosné asi 10-15 cm pod květenstvím bezlisté
Listy	stříbrné, vztříčné, asi 0,5-2 x 0,5 cm velké, hluboce rozeklanné (peřenosečné), aromatické
Květenství	cca 1-2cm velký úbor žluté barvy s víceřadým zákrovem
Květy	jazykovité květy chybí, trubkovité sytě žluté.
Plody	čtyřhranné nažky bez chmíří
Možnost záměny taxonu (+..	Podobná Santolina rosmarinifolia s jemnějším a méně stříbrným listem
Vytrvalost	vytrvalost závislá na zimních teplotách; mrazuvzdorná do cca - 20 C
Dlouhověkost	na vhodném stanovišti dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	plné slunce
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplé výhřevné polohy
Faktor vody	suché
Faktor půdy	propustné, suché kamenisté i písčité

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	celoročně atraktivní stálezeleným stříbřitým listem
Použití - pro trvalky	V Pp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití	široké možnosti použití ve výsadbách přírodě blízkého a záhonového charakteru, koruny suchých zídek, alpina, kolem chodníků v kontaktu s kamenem, se šlapáky, slepecké a jiné tematické zahrady aj.
Růstové i jiné druhově spec..	po odkvetení seřezat odkvetlá květenství, vhodné také seřezání na jaře podobně jako u levandule z důvodu udržení kompaktního tvaru nebo po namrznutí. V tuhých zimách může namrznat (ochrana), Má dobré regenerační vlastnosti,
Doporučený spon pro výsad..	1-3 ks/m ²

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Grafické přílohy



