

Taxon Vitis vinifera Leanka

Název taxonu	Vitis vinifera Leanka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Leánka (Dívčí hrozen)´ (DH)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Feteasca Alba, Fehér Leányka, Mädhentraube, Fetjaska belaja
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patně maďarský, křížení není známo

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, široce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule kulatá, středně velká, žlutozelená; na vrcholu bobule je černá tečka po blizně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Pesecká Leánka´ (má užší bazální výkroj)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy humóznější, písčitohlinité a hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož většinou SO 4, CR 2 i Kober 125 AA; na sušší stanoviště Kober 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci střední odolnost k houbovým chorobám
Plodnost středně až pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína víno má výrazný charakteristický buket, je hořkomandlové vůně i chuti s vyšší kyselinou
Doporučená technologie vína jakostní i přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

