

Taxon *Sempervivum arachnoideum*

Název taxonu	<i>Sempervivum arachnoideum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Sempervivum arachnoideum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Kappa’
Český název	netřesk pavučinkatý
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Sempervivum webbianum</i> Hort.ex Lehm.& Schnitt.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. tomentosum (Lehm.& Schnitt.) Schinz.& Tell.

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Appeniny, Alpy, Pyreneje

Zařazení

Fytocenologický původ	oreofyt / petrofyty, phellophyty - křemencové skály a sutě v subalpinském a alpském stupni (subsp. tomentosum níže)
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Životní forma - poznámka	sukulent
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	neveliké sukulentní listové růžice s dceřinými růžicemi na krátkých stolonech
Kořen	masitý
Výhony	sympodium - květní lodyhy 0.1-0.2 m, hustě listnaté, žláznaté, po odkvětu odumírající
Listy	spirálně sestavené v husté růžici, hrotnatě obkopynaté, masité, žláznaté s chomáčky bílých kadeřavých chlupů pavučinkovitě splétaných s chlupy jiných listů
Květenství	kompaktní hvězdčovitě rozbíhavé vijany
Květy	aktinomorfní, různobalné s žláznatými kalichy, hvězdčovitě osmi až desetičetné, karmínové s 16-20ti purpurovými prašníky, žláznaté
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hnědé měchýřky bez okrasné hodnoty

Semena	velmi drobná, elipčitá, podélně proužkovaná
Možnost záměny taxonu (+..	nezaměnitelné - neméně výrazně oděné Sempervivum ciliosum Craib. má chlupy zcela jiného charakteru a kvete žlutozeleně. Situace je ale komplikována značným množstvím hybridů s druhy jiných sekcí.
Dlouhověkost	nepříliš dlouhověká (a růžice jednoleté)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -25°C (USDA)
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	propustná, spíše zásaditá s vyšším podílem organické složky
Faktor půdy - vápnostřežný	✓
Faktor půdy - poznámka	subsp. tomentosum je k vápníku tolerantnější

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	skalky, suché zídky
Doporučený spon pro výsad..	16-24 rostlin na m2

Množení

Množení	Dělení trsů a Množení šlahouny
Konečné hrnky	8 cm
Retardace	ne
Doba kultivace	40-60 týdnů
Odrůdy	odrůdy lišící se velikostí, zabarvením a oděním listů

Ostatní

VBN statistiky	Sempervivum tuinplanten: 2006 - 2 605 187 prodaných hrnků "overig"
Odkazy	Konop R. (1987): Netřesky. ČZS - ZO klubu skalničkářů, Praha;

Šinko M., Uher J. (2012): Rozchodníky a netřesky 5: Sempervivum. Zahradnictví 11 (2): 28-31; Wills H., Wils S. (2004). An introduction to Sempervivum and Jovibarba species and cultivars. Fernwo

Grafické přílohy









