

Taxon Vitis labrusca diana

Název taxonu	Vitis labrusca diana
Vědecký název taxonu	Vitis labrusca
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Diana´ (Di)
Český název	réva liščí
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	americká labrusková odrůda, vznikla z volného opylení odrůdy ´Catawba´

Zařazení

Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	menší, špičaté
Listy	středně velké až velké, pavézovité, trojlaločnaté, většinou s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch vrásčitý, vespod lehce plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, volnější, na krátké stopce; bobule je tředně velká až velká, kulatá, světle růžová, ojíněná
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	lépe lehčí, ale humóznější půdy
Faktor půdy	úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysoké i střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez
Podnož	do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová až stolní odrůda - výroba burčáku i lehčího bílého až narůžovělého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	vyšší odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 6-9 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je bílé až slabě narůžovělé, silně aromatické, vonící po lesních jahodách, s vysokou kyselinou
Doporučená technologie vína	burčák, stolní, jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 93, 132\)](#)

