

# Taxon Vitis vinifera Neronet

Název taxonu	Vitis vinifera Neronet
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Neronet´ (Ne)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	C-15
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd (´Svatovavřínecké´ x ´Modrý Portugal´) x ´Alibernet´

## Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyžrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený s průsvitem; povrch listu je tmavě zelený, slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý hrozen, volnější; má středně velké kulaté bobule, tmavě modré barvy
Semena	menší, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Rubinet´ (Ne má větší listy)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Zář  
Konec doby zrání Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)  
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá  
Faktor vody vyžaduje hlubší vododržné půdy  
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy  
Faktor půdy - vápnomilný ✓  
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení  
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez  
Podnoží na chudších půdách Kober 125 AA i Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

## Užitné vlastnosti

---

Použití modrá moštová barvířková odrůda - výroba červeného vína  
Choroby a škůdci citlivější k padlí a plísni révové  
Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 10-13 t/ha)

## Množení

---

Množení Roubování  
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací  
Popis vína víno je intenzivní sytě červené barvy, neutrální chuti a jemnými tříslovinami  
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 122\)](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

