

# Taxon *Physocarphus opulifolius* 'Dart's Gold'

Název taxonu	<i>Physocarphus opulifolius</i> 'Dart's Gold'
Vědecký název taxonu	<i>Physocarphus opulifolius</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(L.) Maxim.</a>
Odrůda	'Dart's Gold'
Český název	tavola kalinolistá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Spiraea opulifolia</i>
Autor	Jana Mokričková ( <a href="mailto:jana_mokri_kov_unknown.cz">jana_mokri_kov_unknown.cz</a> )
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Physocarpus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
Biogeografické regiony - po..	Pôvod kultivaru: byl uveden na trh v roce 1969, USA

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	Opadavý, středně až bujně rostoucí, rozložitý keř, dosahuje v 10 letech výšky 1,5 až 2,0 m, ve 20 letech výšky 2,0 až 2,5 m
Výhony	hnědé s popraskanou odlupující se borkou, letorosty lysé
Listy	při rašení svítivě žluté, později zeleno-žluté, střídavé, většinou troj-laločnaté, podobné kalině obecné, délka 5 - 7 cm
Květenství	polokulovitý okolík
Květy	12 mm široké, bílé, často bledě růžové
Plody	kožovité měchýřky, po 3-5, celé lysé, na bázi srostlé, červenavé, puchýřnatě nafouklé, 6-10 mm délka
Kůra a borka	odlupující se

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	ve stínu listy málo vybarvují do žluta
Faktor tepla	Zóna 3 (do - 40 °C), plně otužilý keř
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách
Faktor půdy	na půdy nenáročný, pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	nevysazovat na silně vápenité půdy

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez odstraňování slabých výhonů, při bujném růstu provádíme radikální zmlazení - řez silných větví u země

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického výrazu v průběhu vegetace

Použití okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

## Množení

---

Množení Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky

Množení - poznámka běžně se kultivar množí bylinnými, a dřevitými řízky, doporučuje se použít rovněž stimulátor o 1000 ppm IBA v roztoku, nebo o koncentraci 3000 ppm IBA v talku

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanovišti 2008

Odkazy

- [www.databaze.dendrologie.cz,](http://www.databaze.dendrologie.cz)
- <http://www.openbaargroen.be>
- <http://www.hatch.org.uk/cultivars-of-woody-plants-volume-i-a-g.html>
- [Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,](http://www.hatch.org.uk/cultivars-of-woody-plants-volume-i-a-g.html)
- [C. G. Davidson,](http://www.hatch.org.uk/cultivars-of-woody-plants-volume-i-a-g.html)