

Taxon *Lonicera tatarica*

Název taxonu	Lonicera tatarica
Vědecký název taxonu	Lonicera tatarica
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	zimolez (kozí list) tatarský
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lonicera

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Evropa, západní Sibiř, střední Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, vzpřímený, bohatě větvený, 2-4 m vysoký keř
Výhony	letorosty lysé, duté
Pupeny	vstřícné
Listy	listy vejčité až kopinaté, 2-8 cm, rub sivozelený, oboustranně lysé, celokrajné, řapíky 2-6 mm
Květy	květy bělavě žluté s růžovým nádechem až tmavě růžové, krátce trubkovité, vně lysé, po 2, koruna 15-25 mm
Plody	plody světle až tmavě červené bobule, zřídka i oranžové či žlutavé, 6-8 mm v průměru, po 2

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce až polostín, ale stín snese také
Faktor tepla	oblast I-IV

Faktor vody	snese suchá stanoviště
Faktor půdy	na půdu nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ
Použití	významný keř, solitéra, okraje porostů, podrosty, tvarované živé ploty, meliorační dřevina
Choroby a škůdci	trpí mšicemi (tzv. "liščí ohony")

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Dřevité řízky
Množení - poznámka	semenem se množí čistý druh na izolovaných, popřípadě endemických, původních stanovištích, nejčastější způsob množení je řízkování pomocí dřevitých řízků
Odrůdy	´Splendens´ - dvě růžové barvy květu, květ velký, ´Alba´ - květ bílý, ´Hack´s Red´ - fialově červené květy