

Taxon Euphorbia epithymoides

Název taxonu	Euphorbia epithymoides
Vědecký název taxonu	Euphorbia epithymoides
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	pryšec mnohobarvý
Synonyma (zahradnický pou..	Euphorbia polychroma A.Kern.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Euphorbia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Jižní Evropa, jih střední Evropy, v ČR domácí na jižní Moravě.

Zařazení

Fytocenologický původ	roste na kamenitých výslunných stráních, lesních světlinách a v lesních lemech, v teplomilných doubravách, obvykle na vápnitém podkladu, v pásmu od nížin po pahorkatiny (botany.cz)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá bylina s velmi dekorativním, pravidelným, téměř kulovitým tvarem
Kořen	silný vícehlavý oddenek a křulovitý kořen
Výhony	30-50 (60) cm vysoké, kulaté na průřezu, měkce pýřité, nevětvené
Listy	střídavé, podlouhlé až elipčité 3-5 cm x 1-2 cm velké, na bázi zaokrouhlené až srdčité, na špičce tupě zakulacené, měkce chloupkaté. Celá rostlina prostoupena mléčnicemi.
Květenství	cyathium (květenství) v podobě 5 ramenného lichookolíku. V době květu se pod květenstvím nápadně žlutě vybarvují listeny
Květy	žluté, drobné, skryté v paždí listenů, nenápadné
Plody	kulovitá tobolka
Semena	okrouhle vejčitá, cca 2-2,5 mm velká
Vytřvalost	vytřvalá, spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vysoce světlomilná a teplomilná rostlina
Faktor tepla	teplomilná
Faktor vody	suchovzdomná. V mokřích a těžkých půdách může vyhnívat.
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	propustné půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době květu a na podzim, kdy listy vybarvují do oranžově-červené barvy
Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	Cenná pro brzké a spolehlivé kvetení na záhonech, kdy ještě nekvete moc záhonových trvalek.
Použití	široké uplatnění v KA - intenzivní i extenzivní vegetační prvky různého typu - např. tradiční i šterkové záhony, stepní partie, alpina, zídky, spáry, světlé porostní lemy apod.
Růstové i jiné druhově spec..	rostlina je prostoupena mléčnicemi a po poranění roní mléko, obsahující různé toxické látky, které způsobují otravy (při požití) a alergie až ekzémy (při kontaktu s kůží). Ve vhodných pěstebních podmínkách se vysemeňuje.
Doporučený spon pro výsad..	5 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní a Bylinné řízky
Odrůdy	z ne příliš četného množství odrůd vyniká 'Purpurea' a 'Bonfire' - burgundové vybarvení celé rostliny, 'Lacy', 'Variegata' - nepravidelně široký nažloutlý okraj listů

Grafické přílohy

