

Taxon Prunus laurocerasus ‘Mano’

Název taxonu	Prunus laurocerasus ‘Mano’
Vědecký název taxonu	Prunus laurocerasus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Mano’
Český název	bobkovišeň lékařská
Synonyma (zahradnický pou..	Laurocerasus officinalis
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Mediterránní oblast a Čínsko-japonská oblast
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kompaktně rostlé a ploše větvené keře, výška až 150 cm, ale šířka je mnohem větší, až 2 m
Výhony	nazelenalé
Listy	střídavé, lesklé, pevné, kožovité na jaře jasně zelené v létě sytě zelené, široce oválné; délka listu 5-7 cm
Květenství	hustý vzpřímený hrozen, 5–12 cm dlouhým
Květy	bílé, do 1 cm velké, silně vonné
Plody	peckovicky, v hustém hroznu, tmavě červené až černé, asi 8 mm dlouhé, kulovitě vejcovité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	kvete ve druhé polivně května

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	vyhovují mu více stanoviště v polostínu, roste dobře i ve stínu, ovšem málo kvete, nesnáší zimní slunce
Faktor tepla	Zóna 6 (do - 23 °C), holomrazy spojené se zimním sluncem poškozují většinou listy a omezeně nevyzrálé vrcholy výhonů
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách
Faktor půdy	půdy kvalitní, živné, propustné, s neutrálním až mírně kyselým pH

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	na jaře odstraníme poškozené vrcholy výhonů až na zdravé dřevo, keře během května a června spolehlivě obrostou, lze tvarovat řezem
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v průběhu celého roku
Použití	okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, podrostové patro vyšších dřevin, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
Množení - poznámka	nejpoužívanější způsob je množení polovyzrálými až vyzrálými řízků, doporučuje se použít rovněž stimulator o 1000 - 3000 ppm IBA v talku

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	ZF - nespecifikováno / Unspecified (Stínoviště)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2010
Odkazy	www.databaze.dendrologie.cz, http://www.openbaargroen.be , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504. C. G. Davidson,