Taxon Cichorium endivia

Název taxonu	Cichorium endivia
Vědecký název taxonu	Cichorium endivia
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	štěrbák zahradní
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. crispum - endivie kadeřavá (mechová), var. la
Nadřazená kategorie	Cichorium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	okolí Středozemního moře

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro růžici listů

Popisné a identifikační znaky

Habitus	růžice listů
Kořen	plytká kořenová soustava, kůlový kořen krátky
Listy	endivie - listy bohatě vykrajované až stříhané, tvaru kopisťovitého až jazykovitého, eskariol - listy robustnější, celokrajnými nebo jen mělce laločnatými, na okraji krepovitě zprohýbanými, barvy tmavě zelené, uvnitř růžice žlutozelené
Květenství	za dlouhého dne prorůsta 0,8 - 1,2 m dlouhá dužnatá lodyha, bohatě rozvětvená, řídce olistěná nesoucí vrcholičnaté květenství
Květy	modré květy sestavené v úbor
Plody	plod je vlastně semeno
Semena	nažka, HTS 1,1 - 1,4 g
Vytrvalost	jednoleté

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete za dlouhého dne

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Prosinec
Doba zrání - poznámka	dle termínu výsadby

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročný, rozte již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí
Faktor půdy	středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	okrajová nekróza listů, zasolení (salinita) půdy, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), padlí čekanky (Erysiphe cichoracearum)
Doporučený spon pro výsad..	0,3 - 0,3 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• P 1: pole - záhon nejblíže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole (dle osevního postupu)