

Taxon Vitis vinifera Irsai Oliver

Název taxonu	Vitis vinifera Irsai Oliver
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Irsai Oliver’ (IO)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Irsay Olivér, Muskat Oliver, Zolotistyj rannij
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Bratislavské bílé’ x ‘Čabaňská perla’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, žlutohnědé, někdy hůře vyzrávajícím
Pupeny	středně velké, špičaté
Listy	malé až středně velké, okrouhlé, pětilaločnaté se středně velkými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, kuželovitý, středně hustý až volný hrozen s delší stopkou; bobule kulatá, středně velká, žlutozelená
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Aromína (IO má hladší listy)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen
Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost nižší
Faktor vody	suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlubší hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažen
Podnož	na chudších půdách Kober 5 BB, Kober 125 AA nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína či burčáku, přímý konzum
Choroby a škůdci	citlivá k houbovým chorobám, napadána hmyzem, sprchává
Plodnost	velmi raná, pravidelná (výnos 5-8 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína	víno vůně muškátové; chuť kratší, s nižším obsahem kyselin, často v dochuti s lehkou hořčinkou
Doporučená technologie vína	burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 122\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

